

INFORMACION PARA PRESCRIBIR REDUCIDA

TUSIGEN NF ®

Ambroxol/ Dextrometorfano
Jarabe
Adulto

Cada 100 mL de JARABE contienen:

Bromhidrato dextrometorfano.....0.225 g
Clorhidrato de ambroxol.....0.225 g
Vehículo c.b.p..... 100.0 mL

Cada 5 mL contienen 11.25 mg de Bromhidrato de Dextrometorfano y 11.25 mg de Clorhidrato de Ambroxol

TUSIGEN NF ®

Ambroxol/ Dextrometorfano
Jarabe
Infantil

Cada 100 mL de JARABE contienen:

Bromhidrato dextrometorfano.....0.113 g
Clorhidrato de ambroxol.....0.150 g
Vehículo c.b.p.....100.0 mL

Cada 5 mL contienen 5.65 mg de Bromhidrato de Dextrometorfano y 7.50 mg de Clorhidrato del Ambroxol

INDICACIONES TERAPEUTICAS: Para el alivio de la tos y como expectorante en el aumento de secreciones bronquiales: bronquitis aguda o crónica, neumonía, bronconeumonía, sinusitis en aquellos procesos donde sea necesario controlar la tos e incrementar la expectoración

CONTRAINDICACIONES:

Pacientes hipersensibles a los componentes de la fórmula, que estén en tratamiento con inhibidores de la MAO, con gastritis o úlcera péptica tos crónica asma o enfisema, no debe usarse en forma concomitante con inhibidores del SNC.

PRECAUCIONES GENERALES:

No exceder la dosis recomendada. Adminístrese con cuidado y a dosis bajas en pacientes con infarto al miocardio reciente. No se recomienda en el embarazo.

PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:

Este medicamento no debe administrarse durante el embarazo y la lactancia.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:

Este medicamento puede causar diarrea, náusea, vómito y cefalea En dosis mayores a la recomendada puede provocar depresión del sistema nervioso y dificultad para respirar.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO

No deberá administrarse a pacientes que se encuentren en tratamiento con inhibidores de la MAO o con tranquilizantes.

PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD

Los estudios en animales realizados no han demostrado que ambroxol o dextrometorfano a las dosis terapéuticas, provoquen alteraciones.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

TUSIGEN ® NF ADULTO: Niños mayores de 12 años y adultos: 2 cucharaditas (10 ml) cada 6 horas.

TUSIGEN ® NF INFANTIL: Niños de 2 a 3 años: 1 cucharadita (5 ml) cada 6 horas. **Niños de 4 a 6 años::** 1½ cucharaditas (7.5 ml) cada 6 horas. **Niños de 7 a 12 años:** 2 cucharaditas (10 ml) cada 6 horas.

SOBREDOSIFICACION O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTIDOTOS):

Puede presentarse mareo nerviosismo y dificultad respiratoria. No se ha reportado depresión del sistema nervioso con dextrometorfano. En algunos casos de sobredosificación puede presentarse más excitación que depresión. Naloxona (antídoto específico) ha sido utilizado con éxito para tratar la sobredosificación con dextrometorfano.

PRESENTACIONES:

Caja con frasco de 150 mL. (Adulto e Infantil) vaso dosificador

Caja con frasco de 120 mL. (Adulto e Infantil) vaso dosificador

LEYENDAS DE PROTECCION:

Contiene aproximadamente 65 por ciento de azúcar. Literatura exclusiva para médicos. No se deje al alcance de los niños. Su venta requiere receta médica. Reporte la sospecha de reacción adversa al correo farmaovigilania@cofepris.com.mx ó farmacovigilancia@liomont.com.mx

Hecho en México por:
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.
Laboratorios Liomont, S.A. de C.V.
Adolfo López Mateos No. 68, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, D.F, México.

Reg. Núm. SSA. VI

® Marca registrada