

06 ABR 2017

Q.F.B. ANABEL MENDOZA MONTFOYA



PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA

Caja con 10, 12 ó 20 tabletas

Logo

ANALGEN®

Naproxeno Sódico
Tableta
220 mg

12 Hrs. de Alivio

* Desinflama y alivia el dolor

* Desinflama y alivia el dolor de articulaciones

* Dolor Muscular

* Alivio del Cólico Menstrual

TESIS
Dictaminador Médico

06 ABR 2017

PATRICIA FABIOLA GUERRERO
LUGO

FÓRMULA:

Cada Tableta contiene:

Naproxeno Sódico	220 mg
Excipiente cbp	1 tableta

INDICACIONES:

ANALGEN® Antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica y antipirética está indicado para el alivio del dolor e inflamación de leves a moderados, de origen articular (como artritis), dental (como analgésico y antiinflamatorio posterior a la manipulación dental), ginecológico (dolor menstrual), muscular (como distensión muscular de cuello, espalda alta y baja) o traumático (golpes, torceduras, desgarres, esguinces, distensiones, así como manipulaciones ortopédicas). También como sintomático para la inflamación, dolor y fiebre, acompañantes de las infecciones respiratorias comunes.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Oral. **Adultos y mayores de 12 años:** Tomar 2 tabletas cada 12 horas. No tomar más de 4 tabletas al día.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No use naproxeno sódico en embarazo o la lactancia

CONTRAINDICACIONES: No usar naproxeno sódico si usted es hipersensible a la formula, a otro analgésico o antiinflamatorio. No usar naproxeno sódico en pacientes con úlcera gástrica, padecimientos del hígado o del riñón o alteraciones en la coagulación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

USO PEDIATRICO: No use naproxeno sódico en menores de 12 años.

REACCIONES SECUNDARIAS: El uso de Naproxeno Sódico puede causarle náusea, vómito, dolor abdominal, urticaria o hipersensibilidad.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y ALIMENTARIAS: Si está tomando medicamentos para el tratamiento de la epilepsia, elevación del ácido úrico y de la presión arterial, no tome naproxeno sódico y consulte a su médico.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: Una dosis excesiva de Naproxeno puede ocasionar náuseas, vómito, dolor abdominal y zumbido de oídos. En caso de tomar una dosis excesiva consulte a su médico.

No exceda la dosis recomendada.

Este medicamento no debe ser empleado durante más de 5 días.

Consérvese a no más de 30°C. Protéjase de la luz

No se deje al alcance de los niños.

Si persisten las molestias consulte a su médico.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@pharmagen.com.mx

farmacovigilancia@pharmagen.com.mx

Reg. Núm. 591M95 SSA VI Lote..... Caducidad....

Precio máximo al público:

Hecho en México, por:

LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.

Adolfo López Mateos No. 68, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México., México.

Para:

PHARMAGEN, S.A. DE C.V.

Adolfo López Mateos No. 68 Bis, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México.

® Marca registrada

Para información relacionada con el producto

Comuníquese al teléfono (Vinieta): 01 800 ó consulte el enlace (link): [sitio Web](#)



06 ABR 2017

Q.F.B. ANABEL MENDOZA MONTOYA



PROYECTO DE MARBETE PARA FRASCO ETIQUETADO O SERIGRAFIADO

Frasco con 10, 12 ó 20 tabletas

Logo

ANALGEN®

Naproxeno Sódico
Tableta
220 mg

12 Hrs. de Alivio

* Desinflama y alivia el dolor

* Desinflama y alivia el dolor de articulaciones

* Dolor Muscular

* Alivio del Cólico Menstrual

TESIS
Dictaminador Médico

06 ABR 2017

PATRICIA FABIOLA GUERRERO
LUGO

FÓRMULA:

Cada Tableta contiene:

Naproxeno Sódico 220 mg
Excipiente cbp 1 tableta

INDICACIONES:

ANALGEN® Antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica y antipirética está indicado para el alivio del dolor e inflamación de leves a moderados, de origen articular (como artritis), dental (como analgésico y antiinflamatorio posterior a la manipulación dental), ginecológico (dolor menstrual), muscular (como distensión muscular de cuello, espalda alta y baja) o traumático (golpes, torceduras, desgarros, esguinces, distensiones, así como manipulaciones ortopédicas). También como sintomático para la inflamación, dolor y fiebre, acompañantes de las infecciones respiratorias comunes.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Oral. **Adultos y mayores de 12 años:** Tomar 2 tabletas cada 12 horas. No tomar más de 4 tabletas al día.



USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No use naproxeno sódico en embarazo o la lactancia.

CONTRAINDICACIONES: No usar naproxeno sódico si usted es hipersensible a la fórmula, a otro analgésico antiinflamatorio, ni usar naproxeno sódico en pacientes con úlcera gástrica, padecimientos del hígado o del riñón o alteraciones en la coagulación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

USO PEDIATRICO: No use naproxeno sódico en menores de 12 años.

REACCIONES SECUNDARIAS: El uso de Naproxeno Sódico puede causarle náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea o hipersensibilidad.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y ALIMENTARIAS: Si está tomando medicamentos para el tratamiento de la epilepsia,

elevación del ácido úrico y de la presión arterial, no tome naproxeno sódico y consulte a su médico.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: Una dosis excesiva de Naproxeno puede ocasionar náusea, vómito, dolor abdominal, zumbido de oídos. En caso de tomar una dosis excesiva consulte a su médico.



No exceda la dosis recomendada.

Este medicamento no debe ser empleado durante más de 5 días.

Consérvese a no más de 30°C. Protéjase de la luz

No se deje al alcance de los niños.

Si persisten las molestias consulte a su médico.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y farmacovigilancia@pharmagen.com.mx

Reg. Núm. 591M95 SSA VI Lote..... Caducidad....

Hecho en México, por:

LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.

Adolfo López Mateos No. 68, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México.

Para:

PHARMAGEN, S.A. DE C.V.

Adolfo López Mateos No. 68 Bis, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México.

® Marca registrada

Para información relacionada con el producto

Comuníquese al teléfono (Viñeta): 01 800 ó consulte el enlace (link): [sitio Web](#)



PROYECTO DE TEXTO PARA ENVASE DE BURBUJA

Logo

ALIVIA EL DOLOR Y LA INFLAMACIÓN

ANALGEN®
Naproxeno Sódico
Tableta
220 mg
Oral

Protéjase de la luz

T E S I S
Dictaminador Médico

06 ABR 2017

Cad... PATRICIA FABICIA GUERRERO
LUGO

T E S I S
Dictaminador Químico

Reg. Núm. 591M95 SSA VI

Lote....

06 ABR 2017

Q.F.B. ANABEL MENDOZA MONTAÑA



COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION
CONTRA RIESGOS SANITARIOS
COMISIÓN DE AUTORIZACION
SANITARIA

06 ABR 2017

Q.F.B. ANABEL MENDOZA MONTOYA



PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA

Caja con 12 tabletas

Logo

ALIVIO DEL DOLOR Y LA INFLAMACIÓN

ANALGEN®
Naproxeno Sódico
Tableta
550 mg

24 hrs. de Alivio

Doble acción
* Analgésico
* Antiinflamatorio

Alivio de:
Dolor Muscular
Torceduras de manos
Traumatismos



FORMULACIÓN:

Cada Tableta contiene:			
Naproxeno sódico	550 mg
Excipiente cbp	1 tableta

INDICACIONES:

ANALGEN® Antiinflamatorio no esteroideo con acción analgésica y antipirética está indicado para el alivio del dolor e inflamación de leves a moderados, de origen articular (como artritis), dental (como analgésico y antiinflamatorio posterior a la manipulación dental), ginecológico (dolor menstrual), muscular (como distensión muscular de cuello, espalda alta y baja) o traumático (golpes, torceduras, desgarres, esguinces, distensiones, así como manipulaciones ortopédicas). También como sintomático para la inflamación, dolor y fiebre, acompañantes de las infecciones respiratorias comunes.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Oral, Adultos y mayores de 12 años: Tomar 1 tableta cada 24 horas. Si el dolor es intenso tomar 1 tableta cada 12 hrs. No Tomar más de 2 tabletas al día.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: No use naproxeno sódico en embarazo o la lactancia

CONTRAINDICACIONES: No usar naproxeno sódico si usted es hipersensibilidad a la fórmula, a otro analgésico o antiinflamatorio. No usar naproxeno sódico en pacientes con úlcera gástrica, padecimientos del hígado o del riñón o alteraciones en la coagulación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

USO PEDIÁTRICO: No use naproxeno sódico en menores de 12 años

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: El uso de Naproxeno Sódico puede causarle, dolor estomacal, dolor de cabeza, náusea, hinchazón de pies y manos, zumbido de oídos y mareos.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y ALIMENTARIAS: Si está tomando medicamentos para el tratamiento de la epilepsia, elevación del ácido úrico y de la presión arterial, no use naproxeno sódico y consulte a su médico.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: Una dosis excesiva de Naproxeno puede ocasionar náuseas, vómito, dolor abdominal y zumbido de oídos. En caso de tomar una dosis excesiva consulte a su médico.

No exceda la dosis recomendada.

Este medicamento no debe ser empleado durante más de 5 Días.

Consérvese a no más de 30°C. Protéjase de la luz.

No se deje al alcance de los niños.

Si persisten las molestias consulte a su médico.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y farmacovigilancia@pharmagen.com.mx

Reg. Núm. 591M95 SSA VI Lote..... Caducidad....

Precio máximo al público:

Hecho en México, por:

LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.

Adolfo López Mateos No. 68, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México.

Para:

PHARMAGEN, S.A. DE C.V.

Adolfo López Mateos No. 68 Bis, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México.

® Marca registrada

Para información relacionada con el producto

Comuníquese al teléfono (Viñeta): 01 800 ó consulte el enlace (link): [sitio Web](#)



PROYECTO DE TEXTO PARA ENVASE DE BURBUJA

Logo

ALIVIA EL DOLOR Y LA INFLAMACIÓN

ANALGEN®
Naproxeno Sódico
Tableta
550 mg
Oral

Protéjase de la luz

Reg. Núm. 591M95 SSA VI

Lote....

Cad...

PATRICIA FABICA GUERRERO
LUGO

TESIS
Dictaminador Químico

06 ABR 2017

Q.F.B. ANABEL MENDOZA MONTOYA

TESIS
Dictaminador Médico

06 ABR 2017



COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION
CONTRA RIESGOS SANITARIOS
COMISION DE AUTORIZACION
SANITARIA