



PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA

Caja con tubo de 30 g y 60 g

Logo

EFICAZ ALIVIO DEL DOLOR Y LA INFLAMACION

ANALGEN®

Naproxeno
10g/100g
Gel

FORMULA- Cada 100 g contiene:
Naproxeno 10 g
Excipiente cbp 100 g

INDICACIONES: Eficaz alivio de la inflamación y dolores musculares causados por: golpes, torceduras, esguinces, desgarres. Auxiliar en el tratamiento de procesos reumáticos.

DOSIS: Una aplicación 2 a 3 veces al día frotando suavemente hasta que el gel se absorba.

VIA DE ADMINISTRACION: Tópica. Léase instructivo.

SU USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Queda bajo la responsabilidad del médico.

CONTRAINDICACIONES: Alergia al naproxeno y a otro analgésico o antiinflamatorio.

USO PEDIATRICO: No se use en menores de 2 años.

REACCIONES SECUNDARIAS: El uso prolongado puede causar reacciones en la piel.

PRECAUCIONES:

- No exceda la dosis recomendada.
- Si persisten las molestias consulte a su médico.
- Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C.
- No se deje al alcance de los niños.

Reg. No. 549M98 SSA V Lote... Caducidad...
Precio máximo al público:

Hecho por:

LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.
Ética Farmacéutica desde 1938
Adolfo López Mateos 68 Col. Cuajimalpa
Del. Cuajimalpa de Morelos C.P. 05000 México, D.F.

Para:

PHARMAGEN S.A. de C.V.
Adolfo López Mateos 68 Bis. Col. Cuajimalpa
Del. Cuajimalpa de Morelos C.P. 05000 México, D.F.

® Marca registrada

Paul
22-02-11

Andrés

Pl. en C. Andrea Almaraz H. 02 MAR 2011



PROYECTO DE MARBETE PARA ETIQUETA

Tubo de 30 g y 60 g

Logo

EFICAZ ALIVIO DEL DOLOR Y LA INFLAMACION

ANALGEN®

Naproxeno
Gel

FORMULA- Cada 100 g contienen:
Naproxeno 10 g
Excipiente cbp 100 g

INDICACIONES: Eficaz alivio de la inflamación y dolores musculares causados por: golpes, torceduras, esguinces, desgarres. Auxiliar en el tratamiento de procesos reumáticos.

DOSIS: Una aplicación 2 a 3 veces al día frotando suavemente hasta que el gel se absorba.

VIA DE ADMINISTRACION: Tópica. Léase instructivo.

SU USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Queda bajo la responsabilidad del médico

CONTRAINDICACIONES: Alergia al naproxeno y a otro analgésico o antiinflamatorio.

USO PEDIATRICO: No se use en menores de 2 años.

REACCIONES SECUNDARIAS: El uso prolongado puede causar reacciones en la piel.

PRECAUCIONES:

No exceda la dosis recomendada.
Si persisten las molestias consulte a su médico.
Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C.
No se deje al alcance de los niños.

Prof. 22-02-11

Reg. No. 549M98 SSA V Lote... Caducidad...

Hecho por:

LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.

Ética Farmacéutica desde 1938

Adolfo López Mateos 68 Col. Cuajimalpa

Del. Cuajimalpa de Morelos C.P. 05000 México, D.F.

D.F.

Para:

PHARMAGEN S.A. de C.V.

Adolfo López Mateos 68 Bis Col. Cuajimalpa

Del. Cuajimalpa de Morelos C.P. 05000 México, D.F.

D.F.

® Marca registrada

[Handwritten signature]
M. en C. Andrea Almaraz N. 02 MAR 2011

Modo de empleo

Una aplicación 2 a 3 veces al día frotando suavemente hasta que el gel se absorba

1 Aplíquese directamente en la zona afectada



2 Frote suavemente



3 Permita su absorción durante unos minutos



*Paul
f.
22-02-11*