

PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA

Caja con tubo de 30 g y 60 g

Logo

RÁPIDO ALIVIO DEL DOLOR Y LA INFLAMACIÓN

ANALGEN® NF
Naproxeno/ Lidocaína
Gel
10g/5g/100g

FORMULA-	Cada 100 g contienen:		
	Naproxeno	10.000 g
	Clorhidrato de Lidocaína	5.000 g
	Excipiente cbp	100.000 g

INDICACIONES: Eficaz alivio del dolor y la inflamación de origen muscular y articular como golpes, torceduras, esguinces, desgarres, distensión muscular en cuello, espalda alta y baja así como traumatismos menores en tejidos blandos. Auxiliar en el tratamiento de procesos reumáticos.

DOSIS: Aplicar de 2 a 3 veces al día frotando suavemente hasta que el gel se absorba.

VIA DE ADMINISTRACION: Tópica. No ingerible.

SU USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Queda bajo la responsabilidad del médico.

CONTRAINDICACIONES: No usar Naproxeno/Lidocaína en personas alérgicas a l naproxeno y/o a la lidocaína o a otro analgésico o antiinflamatorio.

USO PEDIATRICO: No deberá usar Naproxeno/Lidocaína en menores de 2 años.



REACCIONES SECUNDARIAS: El uso de Naproxeno/Lidocaína prolongado puede causar reacciones en la piel.

PRECAUCIONES:

No exceda la dosis recomendada.
No se deje al alcance de los niños
Si persisten las molestias consulte a su médico.
Consérvese a no más de 30°C y en lugar seco.
"Este medicamento contiene color azul No. 1, el cual puede producir reacciones alérgicas".
Reporte las sospechas de reacción adversa al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx ó farmacovigilancia@pharmagen.com.mx

Reg. Núm. 045M2008 SSA VI Lote... Caducidad...

Precio máximo al público:

	DICTAMINADOR QUÍMICO
21 OCT. 2014	
Nombre:	Blanca Estela Arredondo Delgado
Firma:	

Hecho por:
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C. V.
Adolfo López Mateos No. 68, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, D.F. México.
Para:
PHARMAGEN S.A. de C.V.
Adolfo López Mateos No.68 Bis. Col. Cuajimalpa, C.P 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, D.F., México.

	DICTAMINADOR MÉDICO
20 OCT. 2014	
Nombre:	
Firma:	

PROYECTO DE MARBETE PARA ETIQUETA

Tubo de 30 g y 60 g

Logo

RÁPIDO ALIVIO DEL DOLOR Y LA INFLAMACIÓN

ANALGEN® NF
Naproxeno/Lidocaína
Gel
10g/5g/100g

FORMULA-	Cada 100 g contienen:		
	Naproxeno	10.000 g
	Clorhidrato de Lidocaína	5.000 g
	Excipiente cbp	100.000 g

INDICACIONES: Eficaz alivio del dolor y la inflamación de origen muscular y articular como golpes, torceduras, esguinces, desgarres, distensión muscular en cuello, espalda alta y baja así como traumatismos menores en tejidos blandos. Auxiliar en el tratamiento de procesos reumáticos.

DOSIS: Aplicar de 2 a 3 veces al día frotando suavemente hasta que el gel se absorba.

VIA DE ADMINISTRACION: Tópica. No ingerible

SU USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Queda bajo la responsabilidad del médico.


CONTRAINDICACIONES: No usar Naproxeno/Lidocaína en personas alérgicas al naproxeno y/o a la lidocaína clorhidrato o a otro analgésico o antiinflamatorio.

USO PEDIATRICO: No deberá usar Naproxeno/Lidocaína en menores de 2 años.

REACCIONES SECUNDARIAS: El uso de Naproxeno/Lidocaína prolongado puede causar reacciones en la piel.

PRECAUCIONES:

No exceda la dosis recomendada.
No se deje al alcance de los niños
Si persisten las molestias consulte a su médico.
Consérvese a no más de 30°C y en lugar seco.
"Este medicamento contiene color azul No. 1, el cual puede producir reacciones alérgicas".
Reporte las sospechas de reacción adversa al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx ó farmacovigilancia@pharmagen.com.mx



Reg. Núm. 045M2008 SSA VI Lote... Caducidad...
Precio máximo al público:

TAPVS DICTAMINADOR QUÍMICO
21 OCT. 2014
Nombre: Blanca Estela Amador Delgado
Firma: [Signature]

Hecho por:
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C. V.
Adolfo López Mateos No. 68, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, D.F. México.
Para:
PHARMAGEN S.A. de C.V.
Adolfo López Mateos No.68 Bis. Col. Cuajimalpa, C.P 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, D.F., México.

TAPVS DICTAMINADOR MÉDICO
20 OCT. 2014
Nombre: [Signature]
Firma: [Signature]